

**Postępowanie w trądziku pospolitym. Wytyczne American Academy of Dermatology na podstawie <http://www.mp.pl>**

**Tabela. Leki stosowane w leczeniu trądziku**

<b>Lek</b>	<b>Postać</b>	<b>Dawka</b>	<b>Nazwa handlowa</b>
<b>stosowane miejscowo</b>			
<b>retinoidy</b>			
adapalen	krem, żel	0,1%	Differin
izotretynoina	żel	0,05%	Isotrex
tazaroten	żel	0,05%, 0,1%	Zorac
tretynoina	krem	0,05%	Locacid, Retin-A
<b>nadtlenek benzoilu</b>	krem, żel, płyn, zawiesina	4-10%	Akneroxid, Benzacne, Brevoxyl, Clearasil, Lubexyl, OXY
<b>antybiotyki</b>			
klindamycyna	żel, emulsja, płyn	1%	Clindacne, Dalacin T, Klindacin T, Zindaclin
erytromycyna	płyn, maść	2%, 2,5%	Aknemycin, Davercin
<b>preparaty złożone</b>			
adapalen + nadtlenek benzoilu	żel	0,1%/2,5%	Epiduo
erytromycyna + izotretynoina	żel	2%/0,05%	Isotrexin
erytromycyna + octan cynku	płyn	4%/1,2%	Zineryt
erytromycyna + tretynoina	żel	4%/0,025%	Aknemycin Plus
klindamycyna + nadtlenek benzoilu	żel	1%/5%	Duac Once Daily Gel
<b>stosowane doustnie</b>			
<b>antybiotyki</b>			
azytromycyna	kaps., tabl. powlek.	125, 250, 500 mg	Azibiot, Azimycin, AziTeva, Azithromycin- ratiopharm, Azitrin, AzitroLek, Azitrox, Azycyna, Macromax,

			Nobaxin, Oranex, Sumamed
doksycyklina	kaps., tabl.	100 mg	Dotur, Doxicin, Doxycyclinum, Doxyratio M, Unidox Solutab
erytromycyna	tabl. powlek.	200, 250 mg	Erythromycinum, Davercin
kotrimoksazol (trimetoprim/sulfametoksazol)	tabl.	160/800 mg	Bactrim forte, Biseptol
limecyklina	kaps.	150, 300 mg	Tetralysal
tetracyklina	tabl. powlek.	250 mg	Tetracyclinum
<b>leki hormonalne</b>			
cyproteron/etynyloestradiol		2/0,035 mg	Cyprest, Diane 35, OC- 35, Syndi-35
drospirenon/etynyloestradiol		3/0,03 mg	Yasmin
spironolakton	tabl.	25, 50, 100 mg	Spirolol, Spirolol 100, Vespiron
<b>retinoidy</b>			
izotretynoina	kaps.	10, 20, 40 mg	Aknenormin, Curacne, Izotek, Tretinex